

Грижі



Єдиним ефективним методом радикального лікування грижі є *оперативне втручання*. Консервативні методи (облітерація грижового мішка, введення в його просвіт хімічних речовин, які спричинюють хронічне запалення очеревини і його облітерацію) мають лише історичний інтерес, оскільки через 2—3 роки після їх використання в усіх хворих виникав рецидив (повторний розвиток) грижі. Застосування бандажу також неефективне і навіть шкідливе. Травмування тканин бандажем зумовлює їх атрофію та атонію, що спричинює збільшення розмірів грижі. Атрофічні зміни в тканинах під бандажем погіршують результати оперативного втручання.

Отже, усунути грижу можна тільки шляхом оперативного втручання. Абсолютних протипоказань до виконання оперативного втручання немає. Протипоказання можуть бути тимчасовими за наявності в пацієнта тяжких супутніх захворювань, які потребують проведення відповідної передопераційної підготовки, спрямованої на корекцію порушення функцій життєво важливих органів і систем організму пацієнта.

Оперативне втручання з приводу усунення грижі з подальшою пластикою грижових воріт може бути виконане як під місцевою анестезією, так і з застосуванням загального знеболювання. Вибір методу знеболювання залежить від віку хворого, його загального стану, виду грижі й інших чинників.